

سوالات استخدامی : آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

۱- در چه سالی آموزش عمومی برای کودکان اجباری شد ؟

۱. ۱۹۱۶ . ۲. ۱۹۲۰ . ۳. ۱۹۳۸ . ۴. ۱۹۷۵

۲- کدام یک از موارد زیر جزو اختلالات خلقی می باشد ؟

۱. بدرفتاری . ۲. کج خلقی . ۳. انگشت مکیدن . ۴. عدم کنترل ادرار

۳- به اعتقاد چه کسی ، نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است ؟

۱. راتر . ۲. دالارد . ۳. بندورا . ۴. آلبرت الیس

۴- جدا سازی - عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری - شناختی و عاطفی هدف کدام مورد زیر است ؟

۱. مصاحبه . ۲. سنجش . ۳. مشاهده . ۴. مذاکره

۵- کدام اصل بر این نکته تاکید دارد که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی را در نظر گرفت ؟

۱. اصل شایستگی سنی . ۲. اصل شدت یک رفتار . ۳. اصل تداوم یک رفتار . ۴. اصل فراوانی یک رفتار

۶- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده ی ثبات و بایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است ؟

۱. شدت . ۲. فراوانی . ۳. تداوم . ۴. ترتیب

۷- کدامیک از موارد زیر ترکیبی از برنامه های آموزش جسمانی و حسی میباشد؟

۱. درمان اختلال رشد هماهنگی . ۲. درمان رشد روانی . ۳. درمان رشد اجتماعی . ۴. درمان رشد اختصاصی

۸- در کدام اختلال ، تولید صداهای تکلمی با سطح رشدی و تکاملی کودک متناسب نیست ؟

۱. لکنت زبان . ۲. اختلال واج شناختی . ۳. اختلال در زبان بیانی . ۴. اختلال در زبان دریافتی - بیانی

۹- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی چیست ؟

۱. تکرار اصوات . ۲. نقص در تلفظ . ۳. مشکل در فهم مکالمات . ۴. ذخیره محدود واژگان

۱۰- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم نقص در کدام مورد زیر است؟

۱. شکل ظاهری . ۲. برقراری ارتباط . ۳. بی خوابی . ۴. تغذیه

۱۱- کدام یک از تکنیک های درمان لکنت بر اساس شرطی سازی عاملی استوار است ؟

۱. دارودرمانی
۲. درمان تعدیلی لکنت
۳. استفاده از دستگاه الکترونیکی
۴. درمان آموزش سلیس و روان صحبت کردن

۱۲- در کدام یک از روش های درمان هرزه خواری ، تقویت منفی و تقویت مثبت مورد استفاده قرار می گیرد ؟

۱. روش محیطی
۲. روش رفتاری
۳. راهنمایی خانوادگی
۴. روش های روانی و اجتماعی

۱۳- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار به معنای کدام مورد زیر است ؟

۱. شیوع
۲. هرزه خواری
۳. سبب شناسی
۴. پرخوری

۱۴- کدامیک از موارد زیر بر حسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص میشود ؟

۱. پرخوری
۲. هرزه خواری
۳. شیوع
۴. بی اشتهایی روانی

۱۵- دیسلکسی نام دیگر کدام اختلال است ؟

۱. خوانش پریشی
۲. عقب ماندگی خواندن
۳. اختلال ویژه در خواندن
۴. اختلال مرتبط به رشد در خواندن

۱۶- بیشترین میزان وقوع نارسایی لکنت زبان در چه سنی برآورد شده است ؟

۱. ۲
۲. ۵
۳. ۷
۴. ۹

۱۷- نارسایی آوا شناختی در بردارنده ی خطاهایی در کدام مورد زیر است ؟

۱. تولید کمی
۲. تولید کیفی
۳. تولید آوا(واج)
۴. تولید ثانویه

۱۸- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چند سالگی اتفاق می افتد ؟

۱. بین یک تا سه سالگی
۲. بین ده تا پانزده سالگی
۳. بین دو تا چهار سالگی
۴. بین دو تا هفت سالگی

۱۹- میزان شیوع بی اختیاری ادرار برای ۱۰ سالگی چقدر است ؟

۱. ۱ تا ۳ درصد
۲. ۳ الی ۵ درصد
۳. ۵ الی ۱۰ درصد
۴. ۱۰ الی ۱۲ درصد

۲۰- احساس دوست داشتن و اعتماد به نفس از فواید کدام نوع درمان در درمان درخودماندگی است ؟

۱. ماساژ درمانی
۲. انزجار درمانی
۳. حیوان درمانی
۴. موسیقی درمانی

۲۱- شروع اختلال رت تا پیش از چه سنی می باشد ؟

۱. یک سالگی
۲. دو سالگی
۳. سه سالگی
۴. چهار سالگی

۲۲- کدامیک از موارد زیر در یک دسته ی بزرگتری به نام اختلالهای عادت‌ی و خوردن قرار دارند ؟

۱. اختلالهای دفع
۲. اختلالهای یادگیری
۳. اختلالهای اجتماعی
۴. اختلالهای اختصاصی

۲۳- اکثر کودکان کنترل مثانه را بین کدام سن زیر به دست می آورند ؟

۱. یک تا دوسالگی
۲. هفت سالگی
۳. بین دو تا سه سالگی
۴. ده سالگی

۲۴- کدامیک از موارد زیر میتواند به صورت اولیه و ثانویه باشد ؟

۱. پرخوری
۲. کم خوری
۳. یادگیری
۴. بی اختیاری ادراری

۲۵- از ویژگی‌های کدام اختلال ، آسیب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی محدود شده است ؟

۱. اختلال رت
۲. اختلال آسیب‌گر
۳. اختلال درخودماندگی
۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۲۶- اوتیسم جزء در کدامیک از اختلالات زیر می باشد ؟

۱. اختلال یادگیری
۲. اختلال رشد
۳. اختلال روانی
۴. اختلال فراگیر مربوط به رشد

۲۷- جدی‌ترین مشکل کودکان در اختلال کم توجهی / بیش فعالی کدام یک از موارد زیر است ؟

۱. بی توجهی
۲. بیش فعالی
۳. تکانش‌گری
۴. جنب و جوش بیش از حد

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	الف
3	ج
4	ب
5	الف
6	ج
7	الف
8	ج
9	ب
10	ب
11	د
12	ب
13	ب
14	د
15	الف
16	ب
17	ج
18	د
19	ب
20	ج
21	د
22	الف
23	ج
24	د
25	ب
26	د
27	الف

۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت چه کسی بود ؟

۱. توماس فیر ۲. استانلی هال ۳. بنیامین راش ۴. ادوارد سکواين

۲- در چه سالی آموزش عمومی برای کودکان اجباری شد ؟

۱. ۱۹۱۶ ۲. ۱۹۲۰ ۳. ۱۹۳۸ ۴. ۱۹۷۵

۳- کدام دیدگاه به وجود یا عدم وجود علائم بیماری تاکید دارد ؟

۱. دیدگاه مرضی ۲. دیدگاه آماری ۳. دیدگاه بهنجاری ۴. دیدگاه آرمان نگر

۴- کدام یک از موارد زیر جزو اختلالات خلقی می باشد ؟

۱. بدرفتاری ۲. کج خلقی ۳. انگشت مکیدن ۴. عدم کنترل ادرار

۵- کدام دیدگاه بر انسان و فرایندهای ذهنی تاکید می کند ؟

۱. رفتارگرایی ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. الگوی روان پویایی

۶- به اعتقاد چه کسی ، نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است ؟

۱. راتر ۲. دالارد ۳. بندورا ۴. آلبرت الیس

۷- شیوه هایی که درمانگر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب کند چه نامیده می شود ؟

۱. رابطه ۲. تکنیک ۳. تشخیص ۴. وضعیت روانی

۸- کدام اصل بر این نکته تاکید دارد که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی را در نظر گرفت ؟

۱. اصل شایستگی سنی ۲. اصل شدت یک رفتار ۳. اصل تداوم یک رفتار ۴. اصل فراوانی یک رفتار

۹- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود ؟

۱. ۱/۲ ۲. ۴ ۳. 5 ۴. 11

۱۰- در کدام اختلال ، تولید صداهای تکلمی با سطح رشدی و تکاملی کودک متناسب نیست ؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال واج شناختی ۳. اختلال در زبان بیانی ۴. اختلال در زبان دریافتی – بیانی

۱۱- مهمترین مشکل در کدام دسته از کودکان ، نقص در برقراری ارتباط است ؟

۱. کودکان اوتیسم
۲. کودکان عقب مانده ذهنی
۳. کودکان دارای اختلال شنوایی
۴. کودکان دارای اختلال بینایی

۱۲- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی چیست ؟

۱. تکرار اصوات
۲. نقص در تلفظ
۳. مشکل در فهم مکالمات
۴. ذخیره محدود واژگان

۱۳- اختلال لکنت زبان معمولاً در کدام دوره رو به بهبودی می‌گذارد و شیوع آن کاهش می‌یابد ؟

۱. دوره پیش دبستانی
۲. دوره دبستان
۳. دوره نوجوانی
۴. دوره جوانی

۱۴- کدام یک از تکنیک های درمان لکنت بر اساس شرطی سازی عاملی استوار است ؟

۱. دارودرمانی
۲. درمان تعدیلی لکنت
۳. استفاده از دستگاه الکترونیکی
۴. درمان آموزش سلیس و روان صحبت کردن

۱۵- اختلال صوت جزو کدام دسته از اختلالات می‌باشد ؟

۱. اختلال آواشناختی
۲. اختلال در زبان بیانی
۳. اختلال ارتباطی نامشخص
۴. اختلال در زبان دریافتی _ بیانی

۱۶- در کدام یک از روش‌های درمان هرزه‌خواری ، تقویت منفی و تقویت مثبت مورد استفاده قرار می‌گیرد ؟

۱. روش محیطی
۲. روش رفتاری
۳. راهنمایی خانوادگی
۴. روش‌های روانی و اجتماعی

۱۷- به اعتقاد مینوچین آنچه در اغلب موارد موجب اختلالات تغذیه‌ای می‌گردد ، به کدام یک از عوامل موثر در بی‌اشتهایی روانی مربوط می‌شود ؟

۱. عوامل خانوادگی
۲. عوامل روانشناختی
۳. عوامل زیست شناختی
۴. عوامل فرهنگی و اجتماعی

۱۸- کدام روش در درمان پرخوری موثرترین روش درمانی شناخته شده است ؟

۱. درمان بین فردی
۲. درمان رفتار جدلی
۳. درمان رفتار دیالکتیکی
۴. درمان شناختی رفتاری

۱۹- دیسلکسی نام دیگر کدام اختلال است ؟

۱. خوانش پریشی
۲. عقب ماندگی خواندن
۳. اختلال ویژه در خواندن
۴. اختلال مرتبط به رشد در خواندن

۲۰- کودک مبتلا به کدام اختلال در نقطه گذاری در جمله ها مشکل دارد ؟

۱. نارسایی خواندن
۲. نارسایی واج شناختی
۳. نارسایی زبان بیانی
۴. نارسایی بیان نوشتاری

۲۱- بیشترین میزان وقوع نارسایی لکنت زبان در چه سنی برآورد شده است ؟

۱. ۲
۲. ۵
۳. ۷
۴. ۹

۲۲- در کدام روش درمانی ، کودک و مربی به طور همزمان با صدای بلند و با یک سرعت متنی را می خوانند ؟

۱. روش دیستار
۲. روش تاثیر عصبی
۳. روش کش دادن گفتار
۴. روش کنترل سرعت گفتار

۲۳- میزان شیوع بی اختیاری ادرار برای ۱۰ سالگی چقدر است ؟

۱. ۱ تا ۳ درصد
۲. ۳ الی ۵ درصد
۳. ۵ الی ۱۰ درصد
۴. ۱۰ الی ۱۲ درصد

۲۴- از ملاک های اساسی برای تشخیص اختلال در خودماندگی کدام یک از موارد زیر است ؟

۱. عاطفه نامناسب
۲. رفتار خودجرحی
۳. رفتار خود تحریکی
۴. نقایص و انحرافات عمده در رشد زبان

۲۵- احساس دوست داشتن و اعتماد به نفس از فواید کدام نوع درمان در درمان درخودماندگی است ؟

۱. ماساژ درمانی
۲. انزجار درمانی
۳. حیوان درمانی
۴. موسیقی درمانی

۲۶- شروع اختلال رت تا پیش از چه سنی می باشد ؟

۱. یک سالگی
۲. دو سالگی
۳. سه سالگی
۴. چهار سالگی

۲۷- از ویژگی های کدام اختلال ، آسیب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی محدود شده است ؟

۱. اختلال رت
۲. اختلال اسپرگر
۳. اختلال درخودماندگی
۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	د
3	الف
4	الف
5	ب
6	ج
7	ب
8	الف
9	ج
10	ج
11	الف
12	ب
13	ج
14	د
15	ج
16	ب
17	الف
18	د
19	الف
20	د
21	ب
22	ب
23	ب
24	د
25	ج
26	د
27	ب

۱- کدامیک از موارد زیر در یک دسته ی بزرگتری به نام اختلالاتی عادی و خوردن قرار دارند ؟

۱. اختلالات دفع ۲. اختلالات یادگیری ۳. اختلالات اجتماعی ۴. اختلالات اختصاصی

۲- کودکان درخودمانده در کدام مورد زیر کمبود عمیق از خود نشان میدهند ؟

۱. در رفتار فردی ۲. در رفتار اجتماعی ۳. در رفتار اولیه ۴. در رفتار ثانویه

۳- اوتیسم جزء در کدامیک از اختلالات زیر می باشد ؟

۱. اختلال یادگیری ۲. اختلال رشد ۳. اختلال روانی ۴. اختلال فراگیر مربوط به رشد

۴- از نظر پیش آگهی اختلال در خودماندگی کدام شرایط زیر را دارد ؟

۱. پیش آگهی مساعدی دارد ۲. پیش آگهی ندارد ۳. پیش آگهی نامساعدی دارد ۴. پیش آگهی دارد

۵- علائم مربوط به رفتارهای تکراری و تشریفاتی در خصوص کودکان در خودمانده به کدام صورت زیر است؟

۱. با گذشت زمان بهبود نمی یابند ۲. با گذشت زمان خوب میشوند ۳. با گذشت زمان ارتباطی ندارد ۴. هنوز مطالعه نشده است

۶- اختلال رت در کدام مورد زیر بیشتر است؟

۱. در پسران ۲. در بزرگسالان ۳. در مردان ۴. در دختران

۷- اختلال آسبرگر از زیر مجموعه های کدامیک از موارد زیر است؟

۱. اختلال اولیه ۲. اختلال فراگیر رشدی ۳. اختلال ثانویه ۴. اختلال کلی

۸- کدامیک از موارد زیر یکی از نشانه های اصلی اختلال بیش فعالی است؟

۱. شیوع ۲. تاخیر در رشد جسمانی ۳. تکانش گری ۴. تاخیر در رشد روانی

۹- کدامیک از موارد زیر میتواند به صورت اولیه و ثانویه باشد ؟

۱. پرخوری ۲. کم خوری ۳. یادگیری ۴. بی اختیاری ادراری

۱۰- کدامیک از موارد زیر درخصوص کودکان با بی اختیاری ادرار صحیح است؟

۱. مشکل راه رفتن دارند
۲. با عوامل روانشناختی همراه است
۳. مشکل خواب دارند
۴. مشکل برخورد دارند

۱۱- اکثر کودکان کنترل مثانه را بین کدام سن زیر به دست می آورند؟

۱. یک تا دوسالگی
۲. هفت سالگی
۳. بین دو تا سه سالگی
۴. ده سالگی

۱۲- درمان کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری ریاضی بر کدام مورد زیر استوار است؟

۱. مداخله های آموزشی
۲. مداخله های دارویی
۳. مداخله های پزشکی
۴. مداخله های روانپزشکی

۱۳- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چند سالگی اتفاق می افتد؟

۱. بین یک تا سه سالگی
۲. بین ده تا پانزده سالگی
۳. بین دو تا چهارسالگی
۴. بین دو تا هفت سالگی

۱۴- در جریان بهنجاری و ناهنجاری کدام مورد زیر موثر بوده اند؟

۱. دیدگاه زیستی و روانشناختی
۲. دیدگاه نظری و کاری
۳. دیدگاه اولیه و ثانویه
۴. دیدگاه عمومی و خصوصی

۱۵- کدامیک از دیدگاههای زیر نقطه مقابل دیدگاه روانکاوی می باشد؟

۱. شناختی
۲. نظری
۳. عملی
۴. رفتارگرایی

۱۶- جدا سازی - عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری - شناختی و عاطفی هدف کدام مورد زیر است؟

۱. مصاحبه
۲. سنجش
۳. مشاهده
۴. مذاکره

۱۷- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه باین کدام مورد زیر است؟

۱. مشاوره
۲. مذاکره
۳. مکاشفه
۴. تشخیص

۱۸- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده ی ثبات و بایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است؟

۱. شدت
۲. فراوانی
۳. تداوم
۴. ترتیب

۱۹- کدامیک از موارد زیر به تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی - هوشی و فیزیکی بستگی دارد؟

۱. رشد اجتماعی
۲. رشد کاری
۳. رشد اختصاصی
۴. رشد طبیعی

۲۰- کدامیک از موارد زیر ترکیبی از برنامه های آموزش جسمانی و حسی میباشد؟

۱. درمان اختلال رشد هماهنگی
۲. درمان رشد روانی
۳. درمان رشد اجتماعی
۴. درمان رشد اختصاصی

۲۱- نشانه های اختلال مهارت های حرکتی معمولاً در کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار میگیرند؟

۱. دوره ی جنینی
۲. دوره کودکی اول
۳. دوره تحصیلات ابتدایی
۴. دوره تحصیلات دبیرستان

۲۲- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم نقص در کدام مورد زیر است؟

۱. شکل ظاهری
۲. برقراری ارتباط
۳. بی خوابی
۴. تغذیه

۲۳- به مراحل پیشرفت صدا در کودکان چه میگویند؟

۱. فرآیند اختصاصی
۲. فرآیند عمومی
۳. فرآیند کمی
۴. فرآیند واج شناسی

۲۴- نارسایی آواشناختی در بردارنده ی خطاهایی در کدام مورد زیر است؟

۱. تولید کمی
۲. تولید کیفی
۳. تولید آوا(واج)
۴. تولید ثانویه

۲۵- کدامیک از موارد زیر یکی از مهمترین اشکال زبان است؟

۱. زبان عمومی
۲. زبان اجتماعی
۳. زبان کاری
۴. زبان نوشتاری

۲۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیل در مدارس کدام مورد زیر است؟

۱. مشکلات حرکتی
۲. مشکلات عمومی
۳. مشکلات خواندن
۴. مشکلات حسی

۲۷- پرخوری معمولاً در کدام مرحله ی سنی زیر شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
۲. اوایل کودکی
۳. اواخر پیری
۴. اوایل نوجوانی

۲۸- کدامیک از موارد زیر بر حسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص میشود؟

۱. پرخوری
۲. هرزه خواری
۳. شیوع
۴. بی اشتهایی روانی

۲۹- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار به معنای کدام مورد زیر است؟

۱. شیوع
۲. هرزه خواری
۳. سبب شناسی
۴. پرخوری

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	الف
2	ب
3	د
4	ج
5	الف
6	د
7	ب
8	ج
9	د
10	ب
11	ج
12	الف
13	د
14	الف
15	د
16	ب
17	د
18	ج
19	د
20	الف
21	ج
22	ب
23	د
24	ج
25	د
26	ج
27	الف
28	د
29	ب

۱- اولین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط انجمن روان پزشکی امریکا در چه سالی منتشر شد؟

۱۹۸۷ .۴

۱۹۸۰ .۳

۱۹۵۲ .۲

۱۹۶۸ .۱

۲- طبق دی اس ام فور تجدید نظر شده ، تشخیص اختلال شخصیت در کدام محور قرار دارد؟

۵ .۴

۴ .۳

۳ .۲

۲ .۱

۳- طبق نظریه فروید کدام گزینه در ایجاد بیماریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

۴ . ترس مرضی

۳ . ترس

۲ . اضطراب

۱ . استرس

۴- شرطی شدن کلاسیک و عامل ، مربوط به کدام الگو می باشد؟

۴ . زیست شناختی

۳ . روان پویایی

۲ . شناختی

۱ . یادگیری

۵- مهم ترین ابراز سنجش ، مداخله و ارزیابی می باشد؟

۲ . آزمون های روانی

۱ . مشاهده

۴ . آزمون های عصب روان شناختی

۳ . مصاحبه

۶- کدام اصل ، نشان دهنده ثبات و پایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است؟

۴ . اصل شایستگی سنی

۳ . اصل فراوانی

۲ . اصل شدت

۱ . اصل تداوم

۷- کدام اختلال جزء اختلالات فراگیر رشد می باشد؟

۴ . لالی انتخابی

۳ . رت

۲ . لکنت زبان

۱ . سلوک

۸- مهمترین مشکل این کودکان ، نقص در برقراری ارتباط می باشد؟

۲ . اوتیسم

۱ . دارای اختلال یادگیری

۴ . افسرده

۳ . بیش فعالی

۹- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی می باشد؟

۴ . نقص در شناخت

۳ . نقص در تلفظ

۲ . نقص در رفتار

۱ . نقص در ادراک

۱۰- این اختلال نوعی خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل ۱ ماه می باشد؟

۴ . پر خوری

۳ . خوردن نامعین

۲ . نشخوارگی

۱ . هرزه خواری

۱۱- برخی از متخصصین بر این عقیده اند که هیچ درمان قطعی برای این اختلال وجود ندارد و درمان بیشتر معطوف به آموزش و تعدیل رفتاری است؟

۱. اوتیسم ۲. ADHD ۳. ODD ۴. هرزخواری

۱۲- اختلال نشخوار عموماً پس از چند ماهگی شروع می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی ۲. ۱۵ ماهگی ۳. ۳ ماهگی ۴. ۶ ماهگی

۱۳- بر اساس معیارهای انجمن روان پزشکی امریکا، تشخیص بی اشتهایی روانی موکول به این است که وزن شخص چند درصد کمتر از حداقل وزن طبیعی فرد باشد؟

۱. ۵۰ درصد ۲. ۴۵ درصد ۳. ۲۵ درصد ۴. ۱۵ درصد

۱۴- در بیان علل زیستی، اختلالات تغذیه، نقص اساسی در وظیفه کدام گزینه می باشد؟

۱. هیپوفیز ۲. تالاموس ۳. هیپوتالاموس ۴. سیستم لیمبیک

۱۵- موثرترین روش درمانی در مورد پر خوری شناخته شده است؟

۱. رفتار درمانی ۲. درمان شناختی رفتاری

۳. دارو درمانی ۴. هیپنوتیزم

۱۶- مبتلایان به کدام اختلال روانی نسبت به مسائل جنسی بی تفاوت هستند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پر اشتهایی روانی ۳. پر خوری ۴. نشخوار

۱۷- نارسایی های یادگیری را بر خلاف تقسیم بند های سنتی، می توانیم به چند دسته کلی تقسیم کنیم؟

۱. ۲ ۲. ۴ ۳. ۶ ۴. ۳

۱۸- در خود ماندگی، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. نوشتن ۲. خوردن ۳. اوتیسم ۴. خواندن

۱۹- کدام گزینه عامل اساسی شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. نوشتن ۲. ریاضی ۳. خواندن ۴. شنیدن

۲۰- خوانش پریشی، مربوط به نقایص کارکردی در کدام لوب های مغزی می باشد؟

۱. آهیانه ای - گیجگاهی ۲. پیشانی - آهیانه ای

۳. آهیانه ای - پس سری ۴. پیشانی - پس سری

۲۱- دیسکلکولی ، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. خواندن ۲. نوشتن ۳. ریاضی ۴. زبان

۲۲- اختلال در تولید گفتار ، نام دیگر کدام اختلال می باشد؟

۱. زبان بیانی ۲. زبان دریافتی ۳. لکنت زبان ۴. آواشناختی

۲۳- مدت زمان لازم برای تشخیص بی اختیاری ادرار می باشد؟

۱. ۱ ماه ۲. ۳ ماه ۳. ۶ ماه ۴. ۱۲ ماه

۲۴- حداقل سن تقویمی برای تشخیص بی اختیاری دفع می باشد؟

۱. ۳ ۲. ۵ ۳. ۲ ۴. ۴

۲۵- مهمترین برنامه های درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری ، مربوط به کدام شرطی شدن می باشد؟

۱. عامل ۲. ابزاری ۳. کنشگر ۴. کلاسیک

۲۶- لئو کانر در مورد کدام اختلال مطالبی را ارائه داده است؟

۱. افسردگی ۲. اوتیسم ۳. یادگیری ۴. کنترل تکانه

۲۷- مادران یخچالی ، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اوتیسم ۲. رت ۳. آسپرگر ۴. ازهم پاشیدگی کودکی

۲۸- استفاده از کدام دارو نشانه های رفتاری اختلال اوتیسم را کاهش می دهد؟

۱. ریتالین ۲. هاوپردول ۳. کلوزاپین ۴. کلرژرومازین

۲۹- شاید بتوان گفت که یکی از بیشترین ویتامین های استفاده شده برای کودکان در خود ماده می باشد؟

۱. E ۲. D ۳. B ۴. A

۳۰- تکانش گری جزء نشانه های کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال سلوک ۲. اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ۳. اختلال بی اعتنایی مقابله ای ۴. اختلال ضد اجتماعی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	الف
3	ب
4	الف
5	ج
6	الف
7	ج
8	ب
9	ج
10	الف
11	د
12	ج
13	د
14	ج
15	ب
16	الف
17	د
18	ج
19	ج
20	الف
21	ج
22	د
23	ب
24	د
25	د
26	ب
27	الف
28	ب
29	ج
30	د

۱- ارزیابی محیط اجتماعی فرد مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. 1 ۲. 2 ۳. 3 ۴. 4

۲- در این رویکرد مفاهیمی همچون اضطراب ، ناخود آگاه و مکانیزم های دفاعی روانی از مفاهیم کلیدی محسوب می شوند؟

۱. الگوی روان پویایی ۲. الگوی زیست شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. الگوی شناختی

۳- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر مربوط به کدام نوع اضطراب می باشد؟

۱. اخلاقی ۲. نوروتیک ۳. واقعی ۴. اساسی

۴- کدام یک از الگوهای زیر به فرایندهای ذهنی تاکید دارد؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی زیست شناختی ۳. الگوی انسان گرایی ۴. الگوی شناختی

۵- کدام یک از گزینه های زیر جزء ابعاد مصاحبه است؟

۱. ارزیابی ۲. وضعیت روانی ۳. طبقه بندی ۴. سبب شناسی

۶- این اصل به تعداد و میزان انجام یک رفتار مربوط می شود؟

۱. اصل تداوم ۲. اصل شدت ۳. اصل فراوانی ۴. اصل شایستگی سنی

۷- نخستین طبقه بندی DSM در چه سالی به چاپ رسید؟

۱. 1968 ۲. 1952 ۳. 1980 ۴. 1994

۸- ویژگی اصلی این اختلال ، نقص در تلفظ است؟

۱. اختلال بیانی ۲. اختلال دریافتی ۳. اختلال دریافتی - بیانی ۴. اختلال واج شناختی

۹- تکنیک تنفس دیافراگمی برای کدام یک از اختلال ها کاربرد دارد؟

۱. اوتیسم ۲. لکنت زبان ۳. اختلال بیانی ۴. بیش فعالی

۱۰- هرزه خواری نوعی خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل چند ماه توصیف شده است؟

۱. 1 ماه ۲. 3 ماه ۳. 6 ماه ۴. 1 سال

۱۱- ویژگی اصلی این اختلال ، برگرداندن مکرر غذا به دهان بر اساس انقباض معده ای و نشخوار طولانی ان است؟

۱. هرزه خواری ۲. بی اشتهایی عصبی ۳. نشخوار ۴. پر اشتهایی عصبی

۱۲- چکاندن آب لیمو در درمان این اختلال می تواند مفید باشد؟

۱. نشخوار ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهاهی عصبی ۴. بینج ایتینگ

۱۳- bulimia nervosa مربوط به کدام اختلال است؟

۱. بی اشتهاهی عصبی ۲. پر خوری ۳. هرزه خواری ۴. نشخوار

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر عامل شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. نوشتن ۲. ریاضی ۳. خواندن ۴. املاء

۱۵- دیسلکسی مربوط به کدام گزینه است؟

۱. مشکل در نوشتن ۲. مشکل در خواندن ۳. مشکل در ریاضی ۴. مشکل در املاء

۱۶- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چند سالگی برآورد کرده اند؟

۱. 5 ۲. 3 ۳. 7 ۴. 2

۱۷- برای تشخیص گذاری بی اختیاری ادرار حداقل چند بار در هفته باید اتفاق بیافتد؟

۱. 1 ۲. 2 ۳. 3 ۴. 4

۱۸- مهمترین برنامه درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری چیست؟

۱. دارو درمانی ۲. شناخت درمانی ۳. رفتار درمانی ۴. بازی درمانی

۱۹- کدام یک از اختلال های زیر جزء اختلالات فراگیر رشد می باشد؟

۱. آسپرگر ۲. بیش فعالی ۳. سلوک ۴. لکنت زبان

۲۰- والدین سرد مربوط به کدام اختلال است؟

۱. بی اعتنایی مقابله ای ۲. ارتباطی ۳. اوتیسم ۴. فوبی

۲۱- کدام یک از داروها می تواند نشانه های رفتاری اوتیسم را کاهش دهد؟

۱. ایمی پرامین ۲. سرتالین ۳. لورازپام ۴. هالوپریدول

۲۲- کدام یک از اختلال های زیر بیشتر در دختران دیده می شود؟

۱. رت ۲. اوتیسم ۳. آسپرگر ۴. از هم پاشیدگی کودکی

۲۳- در بیشتر موارد ، اولین مشکل آشکار کودکان مبتلا به کمبود توجه و بیش فعالی کدام گزینه می باشد؟

۱. بیش فعالی ۲. کمبود توجه ۳. تکانشگری ۴. اضطراب

۲۴- رفتار بدون فکر مربوط به کدام گزینه است؟

۱. تکانشگری ۲. اضطراب ۳. افسردگی ۴. کمبود توجه

۲۵- در ADHD آخرین علامتی که بر طرف می شود، چیست؟

۱. پر تحرکی ۲. حواس پرتی ۳. تکانشگری ۴. اضطراب

۲۶- داروهای محرک برای کدام اختلال کاربرد دارد؟

۱. افسردگی ۲. مانیا
۳. اضطرابی ۴. کمبود توجه و بیش فعالی

۲۷- مشخصه اصلی این اختلال ، الگوی پایداری از رفتار منفی کارانه ، و رفتار خصومت آمیز نسبت به صاحبان قدرت میباشد؟

۱. CD ۲. ODD ۳. ADHD ۴. MDD

۲۸- نشانه های اختلال بی اعتنایی مقابله ای باید چند ماه تداوم داشته باشد؟

۱. 6 ۲. 3 ۳. 1 ۴. 8

۲۹- شروع قبل از 30 ماهگی ، رشد اجتماعی ناقص ، رشد زبان با تاخیر ، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. اوتیسم ۳. افسردگی ۴. اختلال یادگیری

۳۰- مدت زمان برای تشخیص بی اختیاری دفع چقدر می باشد؟

۱. 1 ماه ۲. 2 ماه ۳. 3 ماه ۴. 4 ماه

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	الف
3	ب
4	د
5	ب
6	ج
7	ب
8	د
9	ب
10	الف
11	ج
12	الف
13	ب
14	ج
15	ب
16	الف
17	ب
18	ج
19	الف
20	ج
21	د
22	الف
23	الف
24	الف
25	ب
26	د
27	ب
28	الف
29	ب
30	ج

۱- اولین درمانگاه روان شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تأسیس شد؟

۱. ویلیام هیلی ۲. ترمن ۳. ویتمر ۴. آلفرد بینه

۲- در این دیدگاه، بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله کمال مطلوب ۲. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار
۳. بهنجاری به منزله سلامت ۴. بهنجاری به منزله فرآیندی آماری

۳- اختلال مزمنی است که مشخصه اصلی آن اضطراب می باشد؟

۱. روان نژادی ۲. روان پریشی ۳. روان گسسته ۴. اختلالات روانی

۴- از نظر فروید، اضطرابی که از عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من-نهاد-من برتر ایجاد می شود؟

۱. واقعی ۲. رویایی ۳. نروتیک ۴. اخلاقی

۵- از نظر باندورا، نبود آن علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. سلامت روانی ۲. انگیزه پیشرفت ۳. خویشتن داری ۴. ارتباط با دیگران

۶- نخستین و بنیادی ترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان است؟

۱. آزمون استاندارد ۲. مصاحبه بالینی ۳. مشاوره روانشناختی ۴. DSM IV

۷- این ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. تشخیص ۲. تکنیک ۳. وضعیت روانی ۴. رابطه

۸- در سنجش رفتاری، از آن به عنوان فن اصلی استفاده می شود؟

۱. مشاهده ۲. رفتار ۳. روابط ۴. کارکرد اجتماعی

۹- این اختلال یک توضیح عمومی برای مشکلات مهارت های فیزیکی می باشد؟

۱. اختلالات جدی حرکتی ۲. اختلال رشد هماهنگی
۳. اختلال عصبی ۴. اختلال مربوط به سن

۱۰- جزء اختلالات تکلم محسوب می شود؟

۱. اختلال ارتباط بیانی ۲. اختلال نظام صوتی
۳. اختلال مختلط ارتباط بیانی-دریافتی ۴. اختلال شفاهی

۱۱- شیوع تأخیرهای زبانی در کودکان زیر 3 سال است؟

۱. 5 تا 10 درصد ۲. 10 تا 15 درصد ۳. 15 تا 20 درصد ۴. 30 تا 40 درصد

۱۲- فرضیه ای که در حال حاضر در توضیح علت این اختلال وجود دارد به نام فرضیه نقص روندی می باشد؟

۱. اختلال هماهنگی حرکتی ۲. اختلال بیش فعالی
۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال زبان بیانی

۱۳- مهم ترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. عقب ماندگی ذهنی ۲. اوتیسم ۳. اختلال شنوایی ۴. اختلال زبانی

۱۴- تنها زمانی در زمره اختلال محسوب می شوند که به دلیل شدید بودن باعث مختل شدن پیشرفت تحصیلی یا ارتباطات اجتماعی فرد شود؟

۱. اختلالات تکلم ۲. اختلال واج شناختی
۳. اختلال مختلط ارتباط بیانی-دریافتی ۴. اختلال ارتباطی نامشخص

۱۵- این اصطلاح به عنوان مترادف نارسایی رشد به کار می رود؟

۱. اختلال جسمی ۲. اختلال تغذیه ۳. اختلال حرکتی ۴. اختلال کودکی

۱۶- اغلب اختلال گذرایی است که معمولاً چند ماه طول می کشد و سپس فروکش می کند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. اختلال پرخوری ۳. اسکیزوفرنی ۴. هرزه خواری

۱۷- برحسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص می شود؟

۱. اختلال تغذیه ۲. پرخوری روانی ۳. بی اشتهایی روانی ۴. تعادل روانی

۱۸- این نظریه پردازان ادعا می کنند کودکانی که به بی اشتهایی مبتلا هستند به دلیل تعاملات مختل مادر-کودک نمی توانند هویت بدنی و احساس تملک بر بدن خود را پرورش دهند؟

۱. رفتارگرایی ۲. روان شناختی ۳. روان پویشی ۴. انسان گرایی

۱۹- اختلال در خودماندگی جزء کدام دسته از اختلالات است؟

۱. نارسایی های ذهنی ۲. نارسایی های ویژه ۳. اختلال آسیبگر ۴. اختلال نافذ رشدی

۲۰- این نارسایی که در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) اختلال در تولید گفتار نام داشت؟

۱. نارسایی آواشناختی ۲. نارسایی زبانی ۳. اختلال گفتار ۴. اختلال بیانی

۲۱- معمولاً شامل مکث ها و مکررگویی هایی می شود که جریان گفتار را منقطع می سازد؟

۱. آفازیا
۲. نارسایی گفتار
۳. نارسایی سیالی
۴. نارسایی آواشناسی

۲۲- به اختلالاتی گفته می شوند که در یک دسته بزرگ تری به نام اختلال های عاداتی و خوردن قرار می گیرند؟

۱. ارتباطی
۲. حرکتی
۳. دفع
۴. خوردن

۲۳- مهم ترین برنامه های درمان آن شامل استفاده از رفتار درمانی با تأکید بر برنامه های شرطی سازی کلاسیک است؟

۱. بی اختیاری دفع
۲. شب ادراری
۳. تیک
۴. تورت

۲۴- تأکید بر یکنواختی رفتارهایی این اختلال که به وسیله کانر و راتر و دیگر پژوهشگران توصیف شده اند؟

۱. اختلال خواندن
۲. لکنت زبان
۳. آفازیا
۴. در خودماندگی

۲۵- کودک توانایی استفاده از دستانش برای حرکات هدفمند را از دست می دهد و در عوض درگیر حرکات قالبی می شود؟

۱. اختلال رشدی
۲. اختلال حرکتی
۳. اختلال رت
۴. اختلال هماهنگی

۲۶- نارسایی های با علل ناشناخته را اغلب چه می نامند؟

۱. نارسایی نامشخص
۲. نارسایی کارکردی مربوط به رشد

۳. نارسایی کارکردی جسمی
۴. نارسایی عضوی

۲۷- از ویژگی های آن آسیب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی محدود شده است؟

۱. رت
۲. تورت
۳. آسپرگر
۴. اوتیسم

۲۸- این اختلال شامل فعالیت ها، علائق و رفتارهای قالبی و تخریبی فراگیر و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارت های ارتباطی است؟

۱. اختلال در خودماندگی
۲. اختلال هماهنگی مربوط به رشد

۳. اختلال اجتماعی
۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۲۹- به فرد کمک می کند که محرک های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد؟

۱. خود کنترلی
۲. خود اعمالی
۳. توجه پایدار
۴. توجه متمرکز

۳۰- الگوی پایدار از رفتار تکراری که در آن حقوق اساسی دیگران یا هنجارها و قواعد عمده اجتماعی متناسب با سن، نادیده گرفته می شود؟

۱. اختلال خلق
۲. اختلال پایدار
۳. اختلال ضد اجتماعی
۴. اختلال سلوک

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	ب
3	الف
4	ج
5	ج
6	ب
7	د
8	الف
9	ب
10	ب
11	ب
12	د
13	ب
14	د
15	ب
16	د
17	ج
18	ج
19	د
20	الف
21	ج
22	ج
23	ب
24	د
25	ج
26	ب
27	ج
28	د
29	ج
30	د

۱- این دیدگاه نخستین دیدگاه مطرح و رویکردی سنتی می باشد؟

۱. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار
۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۳. بهنجاری به منزله سلامت
۴. بهنجاری به منزله آرامش ذهن

۲- اختلال مزمنی است که مشخصه اصلی آن اضطراب می باشد؟

۱. روان پریش
۲. روان نژندی
۳. نوروز
۴. اختلال اضطرابی

۳- انجام عملی بر خلاف وجدان و ارزش های مورد قبول فرد است؟

۱. اضطراب اخلاقی
۲. اضطراب نروتیک
۳. اضطراب واقعی
۴. اضطراب روانی

۴- از نظر باندورا، علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. نبود آرامش
۲. اضطراب
۳. افکار منفی
۴. نبود خویشتن داری

۵- نخستین و بنیادترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان است؟

۱. مصاحبه روانکاوی جامع
۲. مصاحبه بالینی جامع
۳. پرسشنامه استاندارد
۴. تشخیص صحیح

۶- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. رابطه
۲. مصاحبه
۳. درک
۴. اجرای پرسشنامه

۷- کدام یک از علایم بالینی، قابلیت نابهنجاری را بالا می برد؟

۱. اتفاقی
۲. پایداری
۳. گذرا
۴. مزمن

۸- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از کدام برنامه های آموزشی می باشد؟

۱. جسمانی و حسی
۲. بازی و ریاضی
۳. جسمانی و روانی
۴. رفتاری و ذهنی

۹- کودکان دچار این اختلال، در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. اختلال آمیخته در زبان دریافتی-بیانی
۲. اختلال در زبان بیانی
۳. اختلال واج شناسی
۴. لکنت زبان

۱۰- مهم ترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. اختلال زبانی
۲. آفازیا
۳. اوتیسم
۴. اختلال بروکا

۱۱- اساس مشکل لکنت زبان است؟

۱. ارتباط گفتاری ۲. ریتم گفتار ۳. نظم معانی ۴. بیان گفتار

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد حدود چند درصد است؟

۱. 2 ۲. 3 ۳. 5 ۴. 1

۱۳- کدام یک از موارد زیر جزء اختلال های خوردن است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوارگی
۳. بی اشتهاپی روانی ۴. اختلال تغذیه دوره شیرخوارگی

۱۴- مطابق با DSM-IV-TR نوعی خوردن مداوم موادغیرمغذی به مدت حداقل یک ماه توصیف شده است؟

۱. بی اشتهاپی شیرخوارگی ۲. هرزه خواری
۳. بیزاری حسی ۴. اختلال تغذیه

۱۵- مینوچین عقیده دارد که آن چه در اغلب موارد موجب اختلالات تغذیه ای می شود، کدام الگو است؟

۱. الگوی فردی و گروهی ۲. الگوی خانوادگی در هم تنیده
۳. الگوی شخصی و جامعه ۴. الگوی فردی در هم تنیده

۱۶- موثرترین روش درمانی در مورد پرخوری شناخته شده است؟

۱. درمان شناختی رفتاری ۲. درمان شناختی
۳. رفتاردرمانی ۴. روان درمانی پویشی

۱۷- دوره های برگشت کننده خوردن با ولع بدون استفاده منظم از رفتارهای جبرانی نامناسب مشخصه آن است؟

۱. پرخوری حاد ۲. پرخوری عصبی
۳. اختلال خوردن نامعین ۴. اختلال پرخوری

۱۸- اختلال در سیالی (روانی) ویژگی تشخیصی براساس DSMIV است؟

۱. اختلال خواندن ۲. اختلال زبان بیانی ۳. اختلال آواشناختی ۴. لکنت زبان عمومی

۱۹- چند درصد از کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری به شکلی در زمینه خواندن مشکل دارند؟

۱. 10 تا 15 ۲. 40 تا 50 ۳. 20 تا 30 ۴. 85 تا 90

۲۰- دیسلکسی است؟

۱. اختلال خوردن ۲. اختلال ریاضی ۳. نارسایی یادگیری ۴. خوانش پریشی

۲۱- نظامی است که تنها در اختیار انسان بوده و با سیستم های ارتباطی سایر جانوران متفاوت است؟

۱. یادگیری ۲. تفکر ۳. زبان ۴. استعداد

۲۲- اختلال های دفع جزء کدام دسته از اختلالات است؟

۱. اختلال های حرکتی ۲. اختلال های عادت و خوردن
۳. اختلال متابولیست ۴. اختلال های کنترل

۲۳- این اختلال از نظر بالینی با وقوع دوباره در هفته برای حداقل سه ماه متوالی و یا احساس ناراحتی قابل توجه از نظر بالینی یا تخریب عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا دیگر زمینه های مهم عملکردی خودش را نشان می دهد؟

۱. اختلال خواندن ۲. اختلال کنترل ۳. بی اختیاری مدفوع ۴. بی اختیاری ادرار

۲۴- از میان اختلال های فراگیر رشدی در DSM-IV_TR هم در حیطه پژوهشی و هم در حیطه بالینی کاملاً چشمگیر و برجسته است؟

۱. درخودماندگی ۲. اختلال خواندن ۳. اختلال حرکتی ۴. ناتوانی یادگیری

۲۵- در ابتدا کانر این اختلال را به عدم پاسخ دهی هیجانی مادران یخچالی نسبت داد؟

۱. آفازیا ۲. درخودماندگی ۳. اختلال دفع ۴. اختلال خوردن

۲۶- کودکان مبتلا به این نشانگان همگی دارای سابقه رشدی مشخص، همراه با وضعیتی طبیعی در چند ماه اول زندگی (5 تا 6 ماه) بودند و بدنبال آن آسیب رشدی ویران گری در کودکان پدید آمده بود؟

۱. اختلال رت ۲. اختلال رشدی ۳. اختلال کمبود توجه ۴. اختلال اوتیسم

۲۷- کدام جمله صحیح است؟

۱. اختلال از هم پاشیدگی کودکی و اختلال اسپرگر بیشتر در پسران شایع است.
۲. اختلال از هم پاشیدگی کودکی و اختلال اسپرگر بیشتر در دختران شایع است.
۳. اختلال از هم پاشیدگی کودکی در دختران و اختلال اسپرگر بیشتر در پسران شایع است.
۴. اختلال از هم پاشیدگی کودکی در پسران و اختلال اسپرگر بیشتر در دختران شایع است.

۲۸- از ویژگی های آن آسیب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی محدود شده است؟

۱. اختلال رشدی ۲. اختلال اسپرگر ۳. اختلال اوتیسم ۴. اختلال وسواس

یاسخ صحیح

شماره
سوال

1	ج
2	ب
3	الف
4	د
5	ب
6	الف
7	ب
8	الف
9	ب
10	ج
11	ب
12	ج
13	ج
14	ب
15	ب
16	الف
17	ب
18	د
19	د
20	د
21	ج
22	ب
23	د
24	الف
25	ب
26	الف
27	الف
28	ب

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی و در چه سالی تاسیس شده است؟

۱. ویلیام هیلی - 1909 ۲. ویتمر - 1896 ۳. ویلیام هیلی - 1896 ۴. ویتمر - 1909

۲- مدرسه گریزی و دزدی در طبقه بندی جدید انجمن روانشناسی امریکا در کدام طبقه قرار دارد؟

۱. اختلالات عادی ۲. اختلالات خلقی ۳. اختلالات اضطرابی ۴. اختلالات اجتماعی

۳- در چهارمین ویرایش کتابچه تشخیص و درمانی اختلالات روانی محور سوم کدام بعد بیماری فرد را ارزیابی می کند؟

۱. تشخیص بیماری جسمی ۲. تشخیص اختلال شخصیت

۳. تشخیص بیماری ۴. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۴- در دیدگاه روان پویایی عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر منجر به کدام نوع اضطراب می گردد؟

۱. اضطراب فرگیر ۲. اضطراب واقعی ۳. اضطراب اخلاقی ۴. اضطراب نروتیک

۵- چه کسی معتقد است نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. دلارد و میلر ۲. باندورا ۳. راتر ۴. بک

۶- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله، و ارزیابی چیست؟

۱. تحقیق میدانی ۲. ارزیابی بالینی ۳. مصاحبه ۴. پژوهش

۷- ویژگی مشترک همه روشهای روان درمانی چیست؟

۱. تکنیک ۲. رابطه ۳. وضعیت روانی ۴. تشخیص

۸- درجات اتفاقی، گذرا و پایدار مربوط به کدام اصل در فرایند تشخیص رفتار نابهنجار است؟

۱. اصل تداوم رفتار ۲. اصل شایستگی سنی ۳. اصل فراوانی ۴. اصل تمایز جنسیتی

۹- جهت بررسی رشد حرکتی کودکان در ارزیابی جهت تشخیص از کدام آزمون استفاده می شود؟

۱. آزمون وکسلر ۲. آزمون بندر گشتالت

۳. آزمون لینکلن اوزرتسکی ۴. آزمون ویمن

۱۰- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدام نشانه مرضی جزء عوامل برون ساخت است؟

۱. تمایل به کنار گیری ۲. فرار از مدرسه ۳. فوبی ۴. تهوع

۱۱- کدام موسسه اصطلاح اختلال رشد هماهنگ را برای توصیف ناهماهنگی حرکتی به کار برده است؟

۱. انجمن یونیسف
۲. سازمان بهداشت جهانی
۳. انجمن طبقه بندی جامع بین المللی
۴. انجمن روان پزشکی آمریکا

۱۲- میزان شیوع اختلال رشد هماهنگ در کودکان مدرسه رو چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. 3 درصد
۲. 5 درصد
۳. 13 درصد
۴. 15 درصد

۱۳- ناتوانی اشخاص در فهمیدن یا به کار بردن مناسب روش های گفتاری و زبانی جامعه به کدام یک از اختلالات زیر دلالت دارد؟

۱. اختلالات گفتاری
۲. اختلالات فراگیر رشد
۳. اختلالات ارتباطی
۴. اختلالات واج شناختی

۱۴- مهمترین مشکل کودکان مبتلا به اتیسم چیست؟

۱. ناتوانی در بازی کردن گروهی
۲. حرکات کلیشه ای
۳. اختلال یادگیری
۴. نقص در برقراری ارتباط

۱۵- درچه سالی اختلال های خوردن به طبقه بندی اصلی اختلالات روانی انتقال یافت؟

۱. 1902
۲. 1984
۳. 1994
۴. 1982

۱۶- هرزه خواری معمولاً بین چند ماهگی شروع می شود؟

۱. 12 تا 24 ماهگی
۲. 12 تا 36 ماهگی
۳. 24 تا 36 ماهگی
۴. تا سه سالگی

۱۷- رفتار های جبرانی نامناسب در کدام یک از اختلالات تغذیه ای مشاهده می شود؟

۱. پر خوری
۲. نشخوار
۳. هرزه خواری
۴. بی اشتهایی روانی

۱۸- متغیر جنسیت مونث و سن نوجوانی در ابتلاء کدام اختلال تغذیه ای نقش دارند؟

۱. هرزه خواری
۲. بی اشتهایی عصبی
۳. اختلال تغذیه شیر خوارگی
۴. نشخوار

۱۹- معیار انجمن روانپزشکی امریکا برای تشخیص بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. از 15 درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد
۲. 15 درصد کمتر از وزن طبیعی داشته باشد
۳. 25 درصد کمتر از وزن طبیعی داشته باشد
۴. از 25 درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد

۲۰- اصطلاح نارسایی های یادگیری توسط چه کسی و در چه سالی ابداع شده است؟

۱. گراهام - 1984
۲. ساموئل کرک - 1984
۳. ساموئل کرک - 1962
۴. گراهام - 1962

۲۱- مشکل در کدام یک از موارد زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس می باشد؟

۱. اختلال در خواندن
۲. اختلال در ریاضی
۳. اختلال در املاء نویسی
۴. اختلال در نوشتن

۲۲- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سالی مشاهده می شود؟

۱. 4 سالگی
۲. 5 سالگی
۳. 6 سالگی
۴. 7 سالگی

۲۳- معیار زمانی برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار در DSM-IV-TR چیست ؟

۱. حداقل سه بار در هفته به مدت 3 ماه - کودکان بالای 3 سال سن داشته باشد
۲. حداقل دوبار در هفته به مدت 3 ماه - کودکان بالای 5 سال سن داشته باشد
۳. حداقل پنج بار در هفته به مدت 3 ماه - کودکان بالای 5 سال سن داشته باشد
۴. حداقل پنج بار در هفته به مدت 3 ماه - کودکان بالای 3 سال سن داشته باشد

۲۴- کدام دارو در درمان بی اختیاری ادراری اثرات درمانی نوید بخشی دارد؟

۱. ایمی پرامین
۲. ربوکسین
۳. فلوکستین
۴. آمی تریپتیلین

۲۵- تاکید بر یکنواختی محیط و رفتار تکراری از ویژگی های رفتار کدام اختلال فراگیر رشد است؟

۱. رت
۲. آسپرگر
۳. اتیسم
۴. اسکیزوفرنی دوران کودکی

۲۶- اختلال شدید در رشد زبان دریافتی و بیانی از ویژگی کدام اختلال فراگیر رشد است؟

۱. رت
۲. آسپرگر
۳. هلر
۴. اسکیزوفرنی دوران کودکی

۲۷- مشخص ترین ویژگی کودکان مبتلا به ADHD چیست؟

۱. بی توجهی
۲. بیش فعالی
۳. تکانشگری
۴. ضعف حافظه

نمبر سوال	ياسخ صحيح
1	ب
2	ب
3	الف
4	د
5	ب
6	ج
7	ب
8	الف
9	ج
10	ب
11	د
12	ب
13	ج
14	د
15	ج
16	الف
17	الف
18	ب
19	ب
20	ج
21	الف
22	ب
23	ب
24	ب
25	ج
26	الف
27	ب

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. آلفرد بینه ۲. استانلی هال ۳. بنیامین راش ۴. ویتمر

۲- در کدامیک از دیدگاه های زیر، بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله فرایند رفتار ۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۳. بهنجاری به منزله سلامت ۴. بهنجاری به منزله سازش با توقعات خود و جهان بیرون

۳- در کدامیک از رویکردهای زیر، مفاهیمی همچون اضطراب، ناخودآگاه، مکانیزم های دفاعی روانی و مراحل رشد روانی جنسی از مفاهیم کلیدی محسوب می شود؟

۱. الگوی روان پویایی ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. الگوی زیست شناختی

۴- نخستین و بنیادی ترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟

۱. مشاهده رفتارهای فرد ۲. پیش آگهی و تعیین یک برنامه درمانی
۳. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی ۴. تداخل در فعالیت فردی و اجتماعی

۵- کدام گزینه از ابزارهای نسبتاً گویا و فراگیر است که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوان دارد؟

۱. آزمون هوش ریون ۲. آزمون روانی شناختی وکسلر

۳. آزمون هوش آلفرد بینه ۴. آزمون پیشرفت تحصیلی

۶- کدامیک از اصل های زیر را می توان به سه درجه اتفاقی، گذرا و پایدار تقسیم بندی نمود؟

۱. اصل شایستگی سنی ۲. اصل فراوانی یک رفتار ۳. اصل شدت یک رفتار ۴. اصل تداعی یک رفتار

۷- بر اساس نظریه پیاژه، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی _ حرکتی به سر می برند؟

۱. کودکی دوم ۲. دوران شیرخوارگی و کودکی اول
۳. دوران بلوغ ۴. کودکی سوم

۸- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلال رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

۱. نشستن ۲. خزیدن ۳. تکلم ۴. راه رفتن

۹- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی می باشد؟

۱. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری ۲. کاردرمانی به همراه آموزش اجتماعی
۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی ۴. گروه درمانی و آموزش های مهارتی

۱۰- کدام گزینه از علل زمینه ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می شوند؟

۱. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالیدگی مغز
۲. فشار زبان و مشکلات کاربردی آن
۳. صدمات ارگانیکی و ساختاری
۴. آپراکسی گفتار

۱۱- کدام گزینه از ویژگی های اوتیسم می باشد؟

۱. این اشکال پس از یک دوره رشد عادی و در نتیجه یک بیماری عصبی یا جسمانی رخ می دهد
۲. این کودکان در تعامل اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازیهای سمبلیک و خلاق مشکل دارند
۳. کودکان دارای اختلال دیرتر از همسالانشان زبان باز می کنند
۴. مهمترین ویژگی بالینی در این افراد اشکال اساسی در درک و در بیان زبان است

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد حدود چند درصد می باشد؟

۱. 1%
۲. 2.5%
۳. 10%
۴. 5%

۱۳- کدام گزینه از جمله اختلالات تغذیه و خوردن است که در دوره رشد آغاز می شود؟

۱. نشخوارگری
۲. بی اشتهایی روانی
۳. پرخوری
۴. اختلال خوردن نامعین

۱۴- اختلال هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. 48_24 ماهگی
۲. 24_12 ماهگی
۳. 36_12 ماهگی
۴. 36_18 ماهگی

۱۵- کدام روش درمانی بعنوان موثرترین روش درمانی در موقع پرخوری شناخته می شود؟

۱. درمانهای روانشناختی
۲. درمانهای دارویی
۳. روان درمانی پویایی
۴. خانواده درمانی

۱۶- در کدامیک از انواع نارسایی های یادگیری مبتلایان به آن از نظر بهره هوشی، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. خوانش پریشی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی ویژه ریاضی
۴. نارسایی های ارتباطی

۱۷- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. 8_6 سالگی
۲. 7_2 سالگی
۳. 5_3 سالگی
۴. 10_8 سالگی

۱۸- پژوهش های پس از مرگ بر روی مغز مبتلایان به دیسلکسی، ناهنجاری در کدام ناحیه از مغز را نشان می دهد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ
۲. لوب گیجگاهی فوقانی
۳. لوب گیجگاهی میانی
۴. بخش آهیانه ای _ گیجگاهی

۱۹- برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار، دفع ادرار باید به چه صورت اتفاق بیفتد؟

۱. حداقل یکبار در هفته به مدت دو ماه
۲. حداقل سه بار در هفته به مدت لااقل یک ماه
۳. حداقل دوبار در هفته به مدت دو ماه
۴. حداقل دوبار در هفته به مدت لااقل سه ماه

۲۰- گزینه صحیح را مشخص کنید؟

۱. بی اختیاری مدفوع اولیه زمانی رخ می دهد که کودک حداقل شش ماه توانسته باشد مدفوعش را کنترل کند
۲. بی اختیاری ادراری ثانویه عمدتاً با تاخیر بلوغ و وزن پایین زمان تولد همراه است
۳. حدود نیمی از کسانی که دچار بی اختیاری مدفوع هستند، بی اختیاری ادرار را نیز نشان می دهند
۴. بر اساس مطالعات همه گیر شناسی مشخص شده که در سن 5 سالگی شیوع بی اختیاری ادراری در پسران دو برابر نسبت آن به دخترهاست

۲۱- مهم ترین برنامه های درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری کدام است؟

۱. استفاده از رفتاردرمانی با تاکید بر شرطی سازی کلاسیک
۲. مداخله های آموزشی و تربیتی
۳. دارودرمانی با استفاده از داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای
۴. درمان شناختی- رفتاری مرتبط

۲۲- نخستین روان پزشکی که در سال ۱۸۶۷ به طور جدی به کودکان خردسالی که مبتلا به اختلال شدید روانی همراه با انحراف، تاخیر و دگرگونی بارز در فرایندهای رشد بودند، توجه نمود چه کسی بود؟

۱. هانس آسپرگر
۲. هنری موزلی
۳. لئوکانر
۴. راتر

۲۳- شیوع کدام رفتار در کودکان درخودمانده در اوقاتی که آنها در سکان های سازمان نیافته تنها هستند، بیشتر است؟

۱. رفتار خودجراحی
۲. رفتار خودتحریکی
۳. رفتار اجتماعی
۴. رفتار تشریفاتی

۲۴- رویکردهای مداخله جویانه ای چون مدل سازی، تقویت، مدیریت خود و آموزش مستقیم مربوط به کدام یک از روش های درمان رفتاری- آموزشی می باشد؟

۱. درمان پاسخ محوری
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. تحلیل رفتار کاربردی

۲۵- کدام یک از داروهای زیر سطح سروتونین خون را کاهش داده و در برخی از کودکان درخودمانده موثر است؟

۱. فن سیکلیدین
۲. هالوپریدول
۳. فن فلورامین
۴. ریتالین

۲۶- شیوع کدام اختلال تنها در دختران تشخیص داده شده است؟

۱. اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی
۲. اختلال اسپرگر
۳. درخودماندگی
۴. اختلال رت

۲۷- حداقل سن شروع اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی چند سالگی است؟

۱. ۲ سالگی
۲. ۴ سالگی
۳. ۳ سالگی
۴. ۵ سالگی

۲۸- کدام اختلال از جمله رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روانشناختی کودکان می باشد؟

۱. اختلال فراگیر مربوط به رشد
۲. نارسایی ذهنی
۳. نارسایی های یادگیری
۴. اختلال کمبود توجه

۲۹- معمولاً نخستین علامتی که در افراد مبتلا به ADHD فروکش نمی کند، کدام است؟

۱. پرتحرکی
۲. حواس پرتی
۳. مشکلات یادگیری
۴. اختلالات خلقی

۳۰- کدامیک از انواع درمانهای زیر مربوط به اختلال سلوک می باشد؟

۱. بازی درمانی
۲. درمان چندالگویی
۳. روان درمانی انفرادی
۴. درمان تغذیه ای

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	د
۲	الف
۳	الف
۴	ج
۵	ب
۶	د
۷	ب
۸	ج
۹	ج
۱۰	الف
۱۱	ب
۱۲	د
۱۳	الف
۱۴	ب
۱۵	الف
۱۶	ج
۱۷	ب
۱۸	د
۱۹	د
۲۰	ج
۲۱	الف
۲۲	ب
۲۳	ب
۲۴	ج
۲۵	ج
۲۶	د
۲۷	الف
۲۸	د
۲۹	الف
۳۰	ج

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تأسیس شد؟

۱. ویتمر ۲. هال ۳. هیلی ۴. مایر

۲- کج خلقی، عدم کنترل ادرار، انگشت مکیدن و خودارضایی در کدام دسته از واکنش های سازگاری کودکان قرار می گیرد؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات عاداتی ۴. اختلالات عصبی

۳- کدام الگو بر انسان و فرایند های ذهنی وی تأکید نموده و مواردی همچون حافظه، فرایندهای یادگیری و فراموشی را مطرح می کند؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روانکاوی

۴- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۵- آزمون ادراکی فراستیک در کدام دسته آزمون ها قرار می گیرد؟

۱. آزمون های بینایی ۲. آزمون های شنوایی ۳. آزمون های روانی ۴. آزمون های رشد

۶- اساس تشخیص اکثر اختلالات بر کدام مورد زیر است؟

۱. وضعیت روانی ۲. مشاهده مستقیم

۳. ارزیابی شخصیت کودک ۴. آزمون های روانی

۷- سیستم عصبی حرکتی در کودکان با اختلال رشد هماهنگی چگونه می باشد؟

۱. بخشی از آن تخریب شده است ۲. همه این سیستم تخریب شده است

۳. سیستم عصبی حرکتی سالم می باشد ۴. در دوران نوزادی سالم است اما به مرور تخریب می شود

۸- مهارتهای کودکان در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده کدام مورد زیر پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال زبان بیانی ۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال اتیسم

۹- مهمترین مشکل کدام اختلالات کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. عقب ماندگی ۲. اختلالات اضطراب جدایی

۳. اختلالات عاداتی ۴. اوتیسم یا اختلالات فراگیر رشد

۱۰- کدام تست برای تشخیص اختلال در زبان بیانی از رایج ترین تست ها می باشد که برای ارزیابی اصول زبان مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. بندر گشتالت ۲. وکسلر ۳. تست باطری ۴. تست بینه

۱۱- در کدام اختلال کودک به طور مداوم قادر نیست اصول تکلمی برخی حروف بی صدا را به نحوی متناسب با رشد بکار گیرد؟

۱. اختلال واج شناختی ۲. لکنت زبان ۳. اختلال زبان بیانی ۴. اختلال زبان دریافتی

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد چند درصد می باشد؟

۱. 12 درصد ۲. 3 درصد ۳. 5 درصد ۴. 10 درصد

۱۳- کدام فرضیه بر آن استوار است که اختلال در زبان بیانی به رشد غیرطبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به روند حافظه می باشد؟

۱. نقص روندی ۲. نقص در ساختار ۳. صدمات ظریف مغزی ۴. نقص در دستور زبان

۱۴- کدام یک از موارد زیر در دسته اختلالات خوردن بزرگسالان قرار می گیرد؟

۱. نشخوارگی ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پیکا

۱۵- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. 18-24 ماهگی ۲. 12-24 ماهگی ۳. 2-3 سالگی ۴. 8-12 ماهگی

۱۶- الگوی خانوادگی در هم تنیده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. مینوچین ۲. یونگ ۳. ویتمر ۴. فروید

۱۷- ویژگی اساسی کدام اختلال برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه است؟

۱. هرزه خواری ۲. بی اشتهایی روانی ۳. پرخوری ۴. نشخوارگری

۱۸- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیزتر است؟

۱. رفتاری-شناختی ۲. رفتار دیالکتیکی ۳. بین فردی ۴. دارو درمانی

۱۹- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام عامل است؟

۱. نحوه مطالعه ۲. عوامل خانوادگی ۳. مشکلات خواندن ۴. مشکلات تدریس معلمان

۲۰- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام بخش مغز است؟

۱. ناحیه پیشانی
۲. ناحیه آهیانه ای
۳. ناحیه پس سری
۴. ناحیه گیجگاهی-آهیانه ای

۲۱- نارسایی در کدام اختلال به دلیل ناتوانی در پردازش اعداد مبنا می باشد؟

۱. لکنت زبان
۲. اختلال خواندن
۳. اختلال آواشناختی
۴. اختلال ریاضی

۲۲- در کدام اختلال نارسایی در سیالی گفتار به اندازه ای است که بر پیشرفت تحصیلی یا شغلی و یا ارتباطات اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. لکنت زبان
۲. آواشناختی
۳. اختلال نوشتاری
۴. اختلال ریاضی

۲۳- حداقل سن برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار چه سنی است؟

۱. 5 سالگی
۲. 3 سالگی
۳. 4 سالگی
۴. 2 سالگی

۲۴- در کدام اختلال بچه هرگز دوره طولانی از کنترل مدفوع را تجربه نکرده است؟

۱. بی اختیاری مدفوع
۲. بی اختیاری مدفوع ثانویه
۳. بی اختیاری مدفوع ثالث
۴. بی اختیاری مدفوع اولیه

۲۵- کدام مورد زیر از علل روانشناختی ابتلا به بی اختیاری مدفوع نیست؟

۱. سوء رفتار جنسی
۲. تنبیه
۳. ابتلا به اختلال روانی
۴. اجتناب از درد هنگام حرکات روده

۲۶- مؤثرترین و مشهورترین برنامه درمان بی اختیاری شب ادراری کدام گزینه می باشد؟

۱. دارو درمانی
۲. رفتار درمانی
۳. دستگاه حساس به ادرار(تشک)
۴. رفتاری- شناختی

۲۷- کدام اختلال فراگیر رشد مربوط به جنس مؤنث است؟

۱. آسپرگر
۲. رت
۳. اتیسم
۴. بیش فعالی

۲۸- کودکان مبتلا به کدام اختلال همزمان دچار اختلال اسکیزوفرنی نیز می شوند؟

۱. درخودماندگی
۲. بیش فعالی
۳. آسپرگر
۴. رت

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	الف
۲	ج
۳	ب
۴	د
۵	الف
۶	د
۷	ج
۸	ب
۹	د
۱۰	ج
۱۱	الف
۱۲	ج
۱۳	الف
۱۴	ج
۱۵	ب
۱۶	الف
۱۷	د
۱۸	الف
۱۹	ج
۲۰	د
۲۱	د
۲۲	الف
۲۳	الف
۲۴	د
۲۵	د
۲۶	ج
۲۷	ب
۲۸	الف

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عاداتی ۲. عاداتی- خلقی ۳. خلقی- اضطرابی ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مشاهده ۲. نقاشی ۳. مصاحبه ۴. بازی

۳- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک ۲. تشخیص ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۴- تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر ۲. دشوار و پیچیده تر
۳. مهمتر و حساس تر ۴. اولویت دار تر و سخت تر

۵- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاینه وضعیت روانی ۲. روان آزمایی
۳. شرح حال ۴. بازی و نقاشی

۶- در سال اول زندگی کودک رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی ۲. عصبی ۳. شناختی ۴. عاطفی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 10 درصد ۲. 5 درصد ۳. 12 درصد ۴. 15 درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی ۲. دریافتی- بیانی ۳. ارتباطی نامشخص ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ، ویژگی اصلی کدام اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی ۲. ارتباطی نامشخص ۳. دریافتی- بیانی ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگی جزو مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی ۲. لکنت زبان ۳. ارتباطی نامشخص ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. 18 ماهگی ۲. 20 ماهگی ۳. 12 ماهگی ۴. 24 ماهگی

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب ۲. ضد افسردگی ۳. خواب آور ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی ۲. روان درمانی حمایتی

۳. خانواده درمانی ۴. رفتار درمانی

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه ۲. نوشتن ۳. شنیدن ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. کلینیک ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن ۲. ریاضی ۳. نوشتن ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. 1 تا 3 سالگی ۲. 2 تا 3 سالگی ۳. 3 تا 5 سالگی ۴. 2 تا 4 سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشناختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. درماندگی آموخته شده
۳. اختلال ارتباط بیانی
۴. اختلال اضطراب اجتماعی

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهایی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی- آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین مشکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تفکر را چه می نامند؟

۱. کم توجهی
۲. نوروزگرایی
۳. تکانشگری
۴. کم فعالی

۲۸- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهایی روانی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. 5 سالگی
۲. 6 سالگی
۳. 4 سالگی
۴. 7 سالگی

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	ب
۲	ج
۳	ج
۴	ب
۵	ب
۶	الف
۷	ب
۸	الف
۹	الف
۱۰	ب
۱۱	الف
۱۲	ب
۱۳	ج
۱۴	ب
۱۵	ج
۱۶	د
۱۷	ب
۱۸	الف
۱۹	ب
۲۰	ج
۲۱	د
۲۲	الف
۲۳	ج
۲۴	الف
۲۵	ج
۲۶	الف
۲۷	ج
۲۸	ب
۲۹	الف
۳۰	د

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عاداتی ۲. عاداتی- خلقی ۳. خلقی- اضطرابی ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مصاحبه ۲. مشاهده ۳. نقاشی ۴. بازی

۳- در سال اول زندگی کودک، رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی ۲. عصبی ۳. شناختی ۴. عاطفی

۴- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک ۲. تشخیص ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۵- تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر ۲. دشوار و پیچیده تر
۳. مهمتر و حساس تر ۴. اولویت دارتر و سخت تر

۶- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاینه وضعیت روانی ۲. روان آزمایی
۳. شرح حال ۴. بازی و نقاشی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 10 درصد ۲. 5 درصد ۳. 12 درصد ۴. 15 درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی ۲. دریافتی- بیانی ۳. ارتباطی نامشخص ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ ویژگی اصلی چه اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی ۲. ارتباطی نامشخص ۳. دریافتی- بیانی ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگی جزء مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی ۲. لکنت زبان ۳. ارتباطی نامشخص ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. 18 ماهگی ۲. 20 ماهگی ۳. 12 ماهگی ۴. 24 ماهگی

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب ۲. ضد افسردگی ۳. خواب آور ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی ۲. روان درمانی حمایتی

۳. خانواده درمانی ۴. رفتار درمانی

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه ۲. نوشتن ۳. شنیدن ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. کلینیک ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن ۲. ریاضی ۳. نوشتن ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. 1 تا 3 سالگی ۲. 2 تا 3 سالگی ۳. 3 تا 5 سالگی ۴. 2 تا 4 سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشناختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه

۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۲- کافر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. درماندگی آموخته شده
۳. اختلال ارتباط بیانی
۴. اختلال اضطراب اجتماعی

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی- آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین شکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تکرار را چه می نامند؟

۱. تکانشگری
۲. کم فعالی
۳. کم توجهی
۴. نوروز گرایی

۲۸- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. 5 سالگی
۲. 7 سالگی
۳. 6 سالگی
۴. 4 سالگی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

نمبر رد سواب	ياشيخ صحيح
١	ب
٢	الف
٣	الف
٤	ج
٥	ب
٦	ب
٧	ب
٨	الف
٩	الف
١٠	ب
١١	الف
١٢	ب
١٣	ج
١٤	ب
١٥	ج
١٦	د
١٧	ب
١٨	الف
١٩	ب
٢٠	ج
٢١	د
٢٢	الف
٢٣	ج
٢٤	الف
٢٥	ج
٢٦	الف
٢٧	الف
٢٨	ب
٢٩	الف
٣٠	ب