قسمتی از سوالات : بیهوشی و احیای قلبی – ریوی

- محدوده زمانی درد در یک آنژین پایدار قلبی چقدر می‌باشد؟

۱)کمتر از ۲۵ دقیقه

۲)کمتر از ۳۰ دقیقه

۳) کمتر از ۱۵ دقیقه

۴)کمتر از ۲۰ دقیقه

جواب گزینه : ۳

- مرحله تحریک ناپذیری در یک سلول عضله قلبی از چه زمانی آغاز می‌شود؟

۱) ابتدای دپلاریزه شدن

۲) اواسط رپولاریزه شدن

۳) انتهای دپولاریزه شدن

۴) در زمان پتانسیل استراحت

جواب گزینه : ۲

- داروهای درموتروپیک چه تاثیری در قلب دارند ؟

۱) برون ده قلبی

۲) هدایت الکتریکی قلب

۳) سرعت ضربان قلب

۴) قدرت انقباضی قلب

جواب گزینه : ۲

- کامیشروتومی به چه معناست ؟

۱) تنگی دریچه تری کاسپید

۲) ایجاد سوراخ در دریچه قلبی

۳) باز کردن چسبندگی های لیف لت دریچه ها

۴) گشاد کردن انولوس

جواب گزینه : ۳

- قدامی‌ترین حفره قلبی کدام است؟

☑ R.ventricle(1
L. ventricle(2
R.atrium(3
L.atrium(4

جواب گزینه : ۱

- تعداد ضربان قلب نوزادی بلافاصله پس از تولد ۵۰ بار در دقیقه می‌باشد، اقدام مناسب بعدی کدام است؟

۱)فشردن قفسه سینه

۲) ارزیابی مناسب بودن تهویه

۳) باز کردن راه هوایی

۴)تجویز اپی نفرین

جواب گزینه : ۱

- شایع ترین عارضه جراحی قلب کدام است ؟

۱) سکته مغزی

۲)تنگی نفس

۳) تپش قلب

۴) سکته قلبی

جواب گزینه : ۱

- کدامیک از بیماری های زیر رایج ترین بیماری سیانوتیک قلبی مادر زادی است ؟

۱) **PDA**

۲) **VSD**

۳) **TOF**

۴) **ASD**

جواب گزینه : ۳

- در قلب سالم چند سن سی تیوم عملی در ساختمان یک قلبی وجود دارد؟

۱ (۱

۲ (۲

۴ (۳

۶(۴

جواب گزینه : ۲

- در روش یک کانوله جهت گذاشتن کانول های ریوی منافذ این کانوله در کجا قرار میگیرد؟

۱)دهلیز راست

۲) بطن راست

۳) دهلیز پپ

۴) دهلیز راست – وناکاوای تحتانی

جواب گزینه : ۴